


Ендокринна терапія раку грудної залози

к.мед.н. Верьовкіна Н.О.
Національний інститут раку
Київ - 2022






Рак Грудної Залози

- Лідируючі позиції по захворюваності у жінок
- Перше місце серед причин смерті від онкологічної патології у жінок
- Загальносвітова тенденція до росту захворюваності
- 60-80% - гормон залежні пухлини

Гетерогенність РГЗ

	Прогностичні	Предиктивні
Вік	V	
Розмір Т	VVV	
Регіонарні ЛВ	VVV	
Диференціювання G	VV	VV
Гістологічний тип	V	V
ER,PR	V	VVV
Her2neu	V	VVV



Eifel P, Axelson JA, Costa J, Crowley J, Curran WJ Jr, Deshler A, et al. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: adjuvant therapy for breast cancer, November 1–3, 2000. J Natl Cancer Inst. 2001;93(13):979–89.

Ендокринна терапія РГЗ

- Ендокринна терапія (ЕТ) при гормон залежному РГЗ знижує
 - ризик рецидиву та смертність від РГЗ
 - (незалежно від того чи була призначена хіміотерапія) (1).

- Всім пацієнтам з гормонзалежним РГЗ повинна призначатись ЕТ за відсутності абсолютних протипоказів (2,3,4).

-

1 EBCTCG *Lancet* 2011 and 2015, 2 ESMO guidelines *Ann Oncol.* 2019
3 San Gallen *Ann Oncol.* 2021, 4 NCCN v4.2022



Ендокринна терапія РГЗ



Ендокринна терапія РГЗ


- ESMO
- ІА та ТАМ - стандарт
- ІА - до, через 2-3 роки після ТАМ, або через 5 років після ТАМ
- Продовження терапії обговорювати з усіма пацієнтами, окрім тих, у кого низький ризик [I, A], оптимальна тривалість ЕТ невідома.
- ASCO
- Тамоксифен до 10 р
- ІА до 5 років
- Тамоксифен 5 р продовжити ІА до 10 років
- Тамоксифен 5 років з переходом на ІА 5 років

Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomized trials



Ендокринна терапія РГЗ


BIG 1-98 Overall Design





*Intent-to-treat population excludes 18 patients who withdrew consent and did not receive study treatment

N Engl J Med 353:2747-2757, 2005

20-річний ризик рецидиву РГЗ після завершення 5 років ендокринної терапії




Ендокринна терапія РГЗ




- Раннє припинення ЕТ
- HR 1,25 (CI 1,09-1,26)
- та недотримання режиму прийому ЕТ асоціювались зі зростанням смертності серед пацієток на РГЗ

Ендокринна терапія РГЗ



Висновки

- Ендокринна терапія повинна призначатись пацієнтам з РГЗ згідно стандартів
- Тривалість та тип ендокринної терапії залежать від факторів ризику, віку та стану здоров'я пацієнта
- Необхідним є інформування пацієнтів про важливість ЕТ, інформування про побічні дії ЕТ та способи зменшення їх проявів
- Сприяння дотримання прийому ЕТ(амбулаторний прийом, доступність ліків, психосоціальна реабілітація пацієнтів



03022, м. Київ, Україна
вул. Ломоносова, 33/43

+38 (044) 259 01 86
+38 (044) 259 02 73

INFO@UNCI.ORG.UA
WWW.UNCI.ORG.UA

Дякую за увагу

